




## Fertigkonzentrat Händedesinfektion

### Haut- und Händedesinfektion

**Hände-  
Desinfektionsmittel  
ohne Reizungen und  
Nebenwirkungen**



**Breites  
Wirkungsspektrum**

### **OXYLYTHE®**

#### Lösung zur Anwendung auf der Haut

Das Hände-Desinfektionsmittel **OXYLYTHE®** ist frei von Farbstoffen und Parfüm. Es ist leicht rückfettend und wirksam gegen Bakterien, Pilze sowie behüllte und unbehüllte Viren.

**Einwirkzeit:** Ca. 20-30 Sekunden Einwirkzeit zur hygienischen Händedesinfektion. Bei Dauergebrauch ist

**OXYLYTHE®** gut verträglich.

**Wirkstoff:** NaCl 0,26%; Hyperchl. Säure (HClO) + Hyperchl. Ion (OCI) 0,05%, pH ~7,2

**Wirkungsspektrum:** Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV). Wirksam gegen Herpes simplex-, Influenza A-, **SARS-Coronavirus**, Adeno-, Polyoma- und Rotavirus.


**Anwendungsbereiche:** Hygienische Händedesinfektion zum Einreiben. Für alle hygienerelevanten Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie, in der häuslichen Hygiene.

**Dosierung:** **OXYLYTHE®** unverdünnt in die trockenen Hände einreiben, dabei alle Hautpartien erfassen. Besonderes Augenmerk auf Fingerkuppen und Daumen legen. Die Hände müssen während der gesamten Zeit mit **OXYLYTHE®** feuchtgehalten werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt



**Schnelle Wirkung  
Hautverträglich**



**Hygienische Händedesinfektion und Tb-Inaktivierung:**

mind. 2 x in 20 sec. in trockene Hände einreiben

**Virus-Inaktivierung:** Herpes, Rota, Vaccina, HBV, HIV, Polio, Adeno, Popova, SARS-Corona

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt

**Darreichungsform:** Lösung zur Anwendung auf der Haut

**Inhalt:** Laut Aufdruck auf Etikett (100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Liter, 5,0 Liter, 10 Liter, 25 Liter)

**Hinweise:**

Bitte beachten Sie das auf dem Etikett angegebene Verfallsdatum. Nach Ablauf dieses Datums soll das Desinfektionsmittel nicht mehr angewendet werden. Nach dem ersten Öffnen des Behältnisses ist die Lösung innerhalb von 6 Monaten zu verbrauchen. Nicht über 30°C lagern.

Das Produkt weist bei der Anwendung einen leichten Chlorgeruch auf. Dieser ist absolut unbedenklich und verflüchtigt sich innerhalb weniger Sekunden!

Bei der Verwendung in Spender- und Sprühsystemen mit metallischen Bauteilen sollte OXYLYTHE® NICHT verwendet werden, da es zu Korrosion und Beeinträchtigung in der Wirksamkeit kommen kann.

**Einwirkzeiten:**

Hygienische Händedesinfektion	20 sec
Bei Tb zweimal anwenden	15 sec.
MRSA	10 sec.
Salmonellen	10 sec.
Candida albicans	10 sec.
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	10 sec.
Herpes simplex-Virus	10 sec.
Influenza A-Virus	10 sec.
<b>SARS-Coronavirus</b>	<b>30 sec.</b>

- Ohne Alkohol -
- nicht toxisch -
- nicht reizend -



Rotavirus	10 sec.
<b>FDA-Keime*</b>	10 sec.
Adenovirus	30 sec.
Polyomavirus	30 sec.

**\* 59 klinisch relevante Bakterienstämme gem. den Anforderungen der U.S. Food and Drug Administration (FDA) - Empfindliche Keime:**

**1. Erreger, die bei Harnwegsinfektionen vorkommen:** Citrobacter spp., Citrobacter diversus, Citrobacter freundii 860, Edwardsiella tarda, Enterobacter spp., Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Hafnia alvei, Klebsiella spp., Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Proteus spp. (Indol-positiv), Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Serratia spp., Pseudomonadaceae, Pseudomonas aeruginosa, Grampositive Kokken, Staphylococcus spp., Staphylococcus spp. (Koagulase-negativ), Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae Gruppe B, Streptococcus Gruppe G, Enterococcus faecium.

**2. Erreger, die bei akuter Gastroenteritis vorkommen:** Aeromonas hydrophila, Campylobacter jejuni, Escherichia coli (enterotoxisch), Plesiomonas shigelloides, Salmonella spp., Salmonella typhi, Shigella spp., Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica,

**3. Andere Erreger:** Bacillus cereus, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Clostridium perfringens. Mäßig empfindliche Keime: Pseudomonas spp., Pseudomonas fluorescens –

**4. Andere Keime:** Flavobacterium spp., Grampositive Kokken, Enterococcus spp., Streptococcus spp., Streptococcus Gruppe D, Enterococcus faecalis. Resistente Keime: Streptococcus bovis

**Zugelassen: Anlage 1, § 11 DIN 901 TrinkwV. ;  
Zugelassen: § 4 Anlage 2 DüMV;  
Zugelassen: Arbeitsblatt W 229/2008 DVGW;  
Geprüft nach EN 1276 & 13704;**



OXYLYTHE® ist eine eingetragene Marke der ART and SOURCE GmbH  
Am Airpark 4, 06217 Merseburg

Tel. 03461 - 8214-311 - Mail - info@artandsource.com - www.artandsource.com - www.oxylythe.com